

# Hypogastricus blokkade

Behandeling van pijn bij kanker bij het  
Pijnbehandelcentrum

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op [www.asz.nl/brmo](http://www.asz.nl/brmo).

**albert  
schweitzer**

# Inleiding

U heeft binnenkort een afspraak voor een hypogastricus blokkade. In deze folder leest u hier meer over.

## Hypogastricus blokkade

Een Hypogastricus blokkade is een behandeling van pijn bij kanker aan de organen in het bekken waarbij pijnstillers onvoldoende werken of te veel bijwerkingen hebben. Deze organen zijn bijvoorbeeld: de dikke darm of de geslachtsorganen.

Via de rug wordt onder röntgendoorlichting een naald naar de voorkant van de wervelkolom gebracht ter hoogte van de overgang van de laatste lendenwervel en het heiligbeen. Via deze naald wordt medicatie gespoten, waarna u vrijwel direct minder pijn heeft.

Als deze behandeling aan twee kanten wordt gedaan, kan dit leiden tot impotentie bij mannen.

Op indicatie kan u tot 24 uur in het ziekenhuis worden opgenomen. Dit wordt in het voorafgaande gesprek met de uitvoerende pijnspecialist besproken.

# Vorbereiding

U heeft ter voorbereiding een gesprek bij uw pijnspecialist over de behandeling, resultaten en complicaties.

Wij adviseren u bij deze gesprekken uw partner of een familielid mee te nemen.

## Allergie

Als u allergisch bent voor bepaalde medicijnen of stoffen, moet u dat vooraf aan uw pijnspecialist te vertellen.

## Nuchter zijn

- Als u voor 12.00 uur wordt behandeld, moet u nuchter zijn vanaf 24.00 uur de avond ervoor.
- Neem uw medicijnen in. Als u bloedverduunners gebruikt heeft uw behandelaar aparte afspraken hierover gemaakt met u.
- Wij raden u af om vooraf te roken.
- Als u diabetes heeft, moet u dit aangeven. Uw arts zal u adviseren wat u vooraf moet doen.

## Geen sieraden en make-up etc.

Tijdens de behandeling mag u geen sieraden, piercings, nagellak of make-up mag dragen. Ook mag u op de dag van de behandeling geen bodylotion gebruiken.

Wilt u ervoor zorgen als u gelnagels draagt dat er op één nagel van uw hand of voet geen gelnagel zit? Het meten van het zuurstofgehalte in het bloed is namelijk niet mogelijk bij gelnagels.

## **Beleving**

We proberen zo goed mogelijk aan te geven wat u kunt verwachten aan ongemak of pijn als u een behandeling krijgt. Toch beleeft ieder mens dat anders en op zijn eigen manier.

Vertel het ons als u ergens tegenop ziet of ongerust bent, dan kunnen we daar nog extra rekening mee houden.

## **De behandeling**

Op de dag van opname meldt u zich op het afgesproken tijdstip op de afgesproken afdeling. Hier krijgt u een operatiejasje aan en wordt uw pijngebied afgetekend. Daarna wordt u naar de operatieafdeling gebracht.

Er wordt een infuusnaaldje in uw arm gebracht. Op indicatie krijgt u een slaapmiddel of pijnstillend middel (roesje), zodat u minder merkt van de behandeling.

U ligt tijdens deze behandeling op uw buik op de behandeltafel. Daarna wordt onder röntgendoorlichting een dunne naald via de rug bij de vierde lendenwervel schuin opgeschoven tot aan de voorkant van de wervelkolom ter hoogte van de vijfde lendenwervel en het heiligbeen. Met contrastvloeistof wordt gekeken of de naald in de juiste positie staat.

Daarna wordt met röntgendoorlichting gedoseerd fenol 6% oplossing gespoten. Dit zorgt vaak direct voor vermindering van de pijn.

Na de behandeling wordt de naald verwijderd en heeft u drie uur bedrust. De behandeling kan meer dan zes maanden een pijnstillend effect geven.

Soms voert de arts alleen maar een blokkade uit om een diagnose te kunnen stellen. In dat geval spuit de arts alleen een verdovingsmiddel om te kijken of deze tumor uw pijn veroorzaakt.

### **Na de behandeling**

Na de behandeling wordt u naar de verkoeverkamer gebracht. Als er geen bijzonderheden zijn en als de pijnspecialist het goed vindt, brengt de verpleegkundige u naar de afdeling.

Op de polikliniek heeft de arts u verteld dat de behandeling invloed heeft op de (aangrenzende) zenuwbanen en weefsels. De behandeling kan de volgende bijwerkingen hebben:

- Incontinentie voor urine en ontlasting.
- Spierzwakte in de benen.
- Verlies van gevoel of juist overgevoeligheid van uw benen en/of het zitvlak.
- Beschadiging doordat een deel van de te geven vloeistof in de bloedbaan komt.
- Impotentie.

We raden u aan om uw temperatuur te controleren. Bij een oplopende temperatuur boven de 38°C belt u de arts (zie kopje arts waarschuwen).

### **Na de behandeling**

Als er geen complicaties zijn mag u aan het einde van de dag onder begeleiding naar huis. Soms zal uw behandelend arts met u overleggen om een nacht in het ziekenhuis te blijven. Dit kan zijn om een andere reden dan de pijn. U wordt dan de volgende ochtend beoordeeld of u naar huis kunt gaan.

## **Controle**

Controle van het effect van de behandeling zal gebeuren door de pijnspecialist die u heeft behandeld. Uw behandelend arts (verwijzer) kan altijd opnieuw contact opnemen met het Pijnbehandelcentrum als uw pijn toeneemt.

## **Een arts waarschuwen**

U belt een arts als u last krijgt van:

- Koorts (oplopende temperatuur boven de 38°C).
- Infectie (roodheid, pus, pijn, warme huid bij de insteekopening van de naald).
- Krachtsverlies.
- Hoofdpijn.
- Veranderingen bij het plassen of poepen.
- Onbegrepen klachten.

Van maandag t/m vrijdag tussen 08.00-12.00 en tussen 13.00-16.30 uur belt u het Pijnbehandelcentrum, tel. (078) 654 22 19.

's Avonds en in het weekend belt u bij acute problemen naar de afdeling Spoedeisende Hulp, tel. (078) 652 32 10.

## **Tot slot**

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, dan kunt u van maandag t/m vrijdag tussen 08.00-12.00 en tussen 13.00-16.30 uur bellen naar het Pijnbehandelcentrum, tel. (078) 654 22 19.

Geef hier uw mening over deze folder: [www.asz.nl/foldertest](http://www.asz.nl/foldertest)



Albert Schweitzer ziekenhuis  
februari 2025  
pavo 0805