

Onderzoek naar MRSA en andere BRMO

Roemeens

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

**albert
schweitzer**

Introducere

Ați primit un pachet pentru testarea MRSA (Stafilococul Auriu Meticilino-Rezistent) și BRMO (Microorganism Deosebit de Rezistente Acest test poate determina dacă sunteți purtător al uneia dintre aceste bacterii.

În această broșură puteți citi mai multe despre aceste bacterii, despre factorii de risc de transmitere, despre măsurile de izolare și administrarea, despre rezultatul și înregistrarea testului.

MRSA și BRMO

MRSA este un microorganism deosebit de rezistent, care seamănă foarte mult cu bacteriile uzuale ale pielii (Staphylococcus aureus).

Pe lângă MRSA, există și alte microorganisme deosebit de rezistente. Pentru aceasta folosim abrevierea BRMO. Adesea, acestea sunt foarte asemănătoare cu bacteriile care apar în mod natural în intestinalele tuturor persoanelor.

De regulă, infecțiile cu Staphylococcus aureus „variante uzuală” și bacteriile intestinale pot fi de tratate ușor cu majoritatea antibioticelor. Antibioticele sunt medicamente careucid bacteriile.

Cu toate acestea, MRSA și BRMO au devenit insensibile la majoritatea antibioticelor. Din acest motiv infecțiile cu aceste bacterii sunt mai dificil de tratat.

Consecințele pentru pacient și spital

Majoritatea persoanelor care contractă MRSA sau BRMO nu prezintă niciun simptom. Dacă nu există simptome, persoana este numit „purtător”. În calitate de purtător, puteți transmite bacteria altor persoane.

În spital, aceste bacterii pot cauza probleme grave. La spital sunt mulți oameni împreună, ceea ce crește riscul de răspândire.

De aceea, fiecare spital din Olanda acordă o atenție deosebită prevenirii răspândirii acestor bacterii. Printre altele, acest lucru este făcut prin examinarea pacienților care sunt suspecți că ar putea fi purtători de MRSA sau alt BMRO, prin testarea pentru verificarea prezenței acestor bacterii.

Factorii de risc pentru transmitere

S-ar putea să fiți purtător dacă:

- Ați fost recent tratat sau internat într-un spital din străinătate sau într-un azil de bătrâni.
- Ați fost internat în ultimul an într-un spital din Olanda sau într-un azil de bătrâni unde predomină MRSA sau BRMO.
- Partenerul/colocatarul dvs. sau cineva de care aveți grijă este purtător de MRSA sau BRMO.
- Urmare a profesiei dvs. sau locuiți la o fermă unde intrați în contact cu porci vii, viței sau pui de carne.
- Locuiți într-un centru de primire pentru solicitanți de azil.
- Ai sub 18 ani și ai fost adoptat din străinătate.

Măsurile de izolare

Dacă se suspectează că sunteți purtător, în cazul unei internări în spital (tratament de o zi, dializă) sau vizitării Serviciului de Urgență (izolare strictă), sunt necesare măsuri de izolare de cel mult 24 de ore. Această măsură de izolare va fi ridicată dacă, în urma testării a rezultat că nu sunteți infectat cu MRSA și BRMO. Nu sunt necesare măsuri de izolare atunci când vizitați ambulatoriul. Măsurile de izolare sunt:

- Veți fi îngrijit într-o cameră de izolare. Aceasta este o cameră single cu antecameră (spațiu intermediar).
- Nu aveți voie să părăsiți camera decât pentru testare sau tratament.
- Ușa camerei dvs. este ținută pe cât posibil închisă.
- Angajații spitalului și vizitatorii care vin în camera dvs. poartă bonetă, mască gura-nas, șorț și mănuși.
- Dacă trebuie să părăsiți camera sau secția, trebuie să purtați mască gura-nas. Veți primi această mască de la asistente.
- Familia dvs. poate duce rufele acasă. Acestea ar trebui puse din camera dvs. într-o pungă de plastic. În antecameră, această pungă trebuie introdusă într-o a doua pungă de plastic.

Testarea pentru MRSA și alte BRMO

Pentru a determina dacă sunteți purtător de MRSA sau alt BRMO, trebuie să treceți printr-o examinare. Puteți citi ce trebuie să faceți în explicația pe care o primiți în acest pachet. Dacă nu reușiți să faceți singur acest lucru, vă puteți adresa medicului dvs. de familie.

Rezultatul și înregistrarea

Dacă testul indică faptul că sunteți purtător de MRSA sau BRMO, medicul dvs. vă va informa în cel mai scurt timp posibil. Medicul dvs. vă va explica dacă este necesar tratamentul.

De asemenea, medicul dvs. va fi informat despre acest lucru.

De asemenea, vom introduce o notificare în dosarul dvs. de pacient că sunteți purtător. Această notificare are scopul ca la următoarea dvs. vizită la spitalul Albert Schweitzer, să fie vizibil că aveți MRSA sau BRMO. Dacă este necesar, se vor lua măsuri de izolare.

Transmiterea și tratamentul

Dacă sunteți purtător de MRSA, puteți fi tratat cu antibiotice. Medicul dvs. curant va decide dacă acest lucru este necesar.

Dacă sunteți purtător de BRMO, nu veți fi tratat cu antibiotice. Până acum acest lucru nu pare să fie util.

Pe lângă faptul că sunt purtător, persoanele cu rezistență redusă se pot infecta și cu MRSA sau BRMO. Infecțiile sunt de obicei tratate cu antibiotice.

În final

Aveți întrebări după ce ați citit Broșura? Vă rugăm să sunați cu încredere la secția de Prevenire a infecțiilor, tel. (078) 654 50 00. Vă răspundem cu drag întrebărilor.

Exprimați-vă părerea cu privire la această broșură:
www.asz.nl/foldertest/

Albert Schweitzer ziekenhuis
mei 2024
pavo 1872