

Nuchter zijn (kinderen) - Turks

Aç Karnına Olmak (Çocuklar)

Çocuğunuzun ameliyat öncesinde aç olması gerekmektedir. Eğer çocuğunuz anestezi sırasında aç değilse, mide içeriğinin solunum yollarına veya akciğerlere kaçma riski artar. Çocuğunuz aç değilse, ameliyat ertelenecektir.

Anestezi uzmanı sizinle farklı bir şey kararlaştırmadıysa, aşağıdaki kurallar geçerlidir:

6 aya kadar olan çocuklar

- Ameliyattan 6 saat öncesine kadar (bebek) süt(ü) ve/veya sonda beslenmesi verilebilir.
- Ameliyattan 4 saat öncesine kadar anne sütü verilebilir.
- Ameliyattan 2 saat öncesine kadar çocuğunuz su ve çay gibi berrak sıvıları biberonda en fazla 150 ml olacak şekilde içebilir.

(Devamı arka sayfada)

6 aydan büyük çocuklar

- Ameliyattan önceki gece saat 24.00'ten itibaren hiçbir şey yememelidir.
- Ameliyattan 1 saat öncesine kadar, çocuđunuz su, řurup, posasız elma suyu, sütsüz çay gibi berrak sıvıları içebilir. Çocuđunuz en fazla 200 ml içebilir.

Eđer ameliyatı beklerken çocuđunuzun sađlık durumunda ve/veya kullandıđı ilaçlarda bir deđişiklik olursa, pazartesi - cuma günleri saat 08.00-12.00 ve 13.00-16.30 arasında tel. (078) 654 13 32 numaralı telefonu arayınız. Bu deđişiklikler hakkında bilgimiz olmazsa, ameliyat iptal edilebilir!