

Imidazolidinyl Urea

Formaldehyde ureum

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

**albert
schweitzer**

Wat is Imidazolidinyl Urea?

Imidazolidinyl Urea is een conserveermiddel waaruit formaldehyde vrijkomt (formaldehyde releaser) Het wordt gebruikt om waterbevattende producten langer houdbaar te maken. Imidazolidinyl urea wordt veel gebruikt in cosmetica en verzorgingsproducten/toiletartikelen.

U bent hier allergisch voor: wat nu?

De dermatoloog heeft aangetoond dat u allergisch bent voor Imidazolidinyl Urea. Wanneer u hiermee in aanraking komt, kan dat eczeem veroorzaken of verergeren. Het is dus belangrijk dat u probeert om contact met Imidazolidinyl Urea, zoveel mogelijk te vermijden.

Imidazolidinyl Urea scheidt formaldehyde af in kleine hoeveelheden. Daarom kan een positieve reactie op Imidazolidinyl Urea zowel worden veroorzaakt door een contactallergie voor formaldehyde ureum als voor een contactallergie voor formaldehyde of voor beide stoffen.

Vermijd gerelateerde stoffen waarvoor u ook allergisch kunt zijn. Hieronder vallen formaldehyde en andere formaldehyde releasers. Deze komen voor in cosmetica, crèmes, industriële vloeistoffen en vloeistoffen bij metaalbewerking.

Waar komt het in voor?

Imidazolidinyl Urea komt onder andere voor in:

- Brandzalf.
- Bruinende crèmes.
- Crèmes, hand- en bodylotions.
- Deodorant, aftershave, geurstoffen.
- Foundation, poeder, concealer.
- Haarverzorgingsmiddelen (conditioner, haarlak, pommade).
- Make-up (blusher) en vloeibare make-up.
- Make-up remover.
- Medicijnen: Op recept verkrijgbare crèmes en zalven.
- Nagelriem remover.
- Oog make-up (oogschaduw, mascara, eyeliner).
- Schuimende acne-wasmiddelen (10% bpo).
- Scrubs, gelreinigers en poriëncleurende pads.
- Shampoos en (baby)badschuim.
- Toiletartikelen zoals Body poeder.
- Wenkbrauwgel.
- Zonnebrandcrème.

Andere benamingen

Vermijd producten met één van de volgende namen bij de ingrediënten:

- 1,1'-Methyleenbis(3-(3-(hydroxymethyl)-2,5-dioxo-4-imidazolidinyl)ureum).
- 1,1'-Methylenebis(3-(3-(hydroxymethyl)- 2,5-dioxo-4-imidazolidinyl)urea).
- Biopure 100®.

- EINECS 254-372-6.
- Germall 115®.
- Imidazolidinyl urea.
- Imidazolidinylureum.
- Imidurea NF®.
- Imidurea®.
- Imidureum.
- Methaanbis(N,N'-(5-ureido-2,4-diketotetrahydroimidazool)-N,N-dimethylol).
- Methanebis(N,N'-(5-ureido-2,4-diketotetrahydroimidazole)-N,Ndimethylol).
- N,N''-Methyleenbis(N'-(3-(hydroxymethyl)-2,5-dioxoimidazolidine-4-yl)ureum).
- N,N-Methylenebis (N'-)1- (hydroxymethyl)-2,5-dioxo-4-imidazolidinyl urea.
- N,N-Methylenebis [N'-[3- (hydroxymethyl)-2,5-dioxo-4-imidazolidinyl).
- N,N''-Methylenebis(N'-(3-(hydroxymethyl)-2,5-dioxoimidazolidin-4-yl) urea).
- Sept 115®.
- Tristat 1U®.
- Unicide U-13®.
- Urea N,N-methylenebis (N'-)1- (hydroxymethyl)-2,5-dioxo-4-imidazolidinyl-.
- Ureum, N,N''-methyleenbis(N'-(1-(hydroxymethyl)-2,5-dioxo-4-imidazolidinyl)-.

Formaldehyde releasende conserveermiddelen om te vermijden:

- Bromonitropropane diol (Bronopol™).
- Diazolidinyl urea (Germall II®).
- DMDM hydantoin (Glydant®).
- Quaternium-15 (Dowicil®).
- Tris (hydroxymethyl) nitromethane (Tris Nitro®).

Kruisreactie

Uw lichaam kan een andere stof aanzien voor Imidazolidinyl Urea. Dan reageert uw lichaam alsof u met Imidazolidinyl Urea in aanraking komt. Dit noemen we een kruisreactie. Dit kan gebeuren bij Diazolidinyl ureum.

Tot slot

Als u na het lezen van de folder nog vragen heeft dan kunt u bellen met de polikliniek Dermatologie, tel. (078) 654 12 36. Dit kan van maandag t/m vrijdag tussen 08.00-12.00 uur en tussen 13.00-16.30 uur.

Geef hier uw mening over deze folder: www.asz.nl/foldertest

Albert Schweitzer ziekenhuis
december 2024
pavo 2035