

# Tixocortol pivalaat

Corticosteroiden groep 1

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op [www.asz.nl/brmo](http://www.asz.nl/brmo).

**albert  
schweitzer**

# Wat zijn corticosteroïden?

Corticosteroïden zijn medicijnen die zijn afgeleid van bijnierschors hormonen. Corticosteroïden onderdrukken allerlei ontstekingsreacties in het lichaam, waaronder ook eczeem. Corticosteroïden worden onderverdeeld in 3 groepen.

## U bent hier allergisch voor: wat nu?

De dermatoloog heeft aangetoond dat u allergisch bent voor Tixocortol pivalaat, een corticosteroïde uit groep 1. Dit betekent dat u allergisch bent voor één of meer corticosteroïden uit groep 1. Wanneer u allergisch bent voor één van de medicijnen uit deze groep, kan het zijn dat u ook allergisch bent voor de andere medicijnen uit dezelfde groep. Wanneer u hiermee in aanraking komt, kan dat eczeem veroorzaken of verergeren. De dermatoloog kan niet voorspellen of u inderdaad voor alle medicijnen uit dezelfde groep allergisch bent. Het is dus belangrijk dat u probeert om contact met corticosteroïden uit groep 1 zoveel mogelijk te vermijden.

Groep 1	Voorbeelden
Budesonide	Budenofalk, Cortiment, Entocort, Pulmicort, Rhinocort, Symbicort, Assieme, Ribuspir, Sinestic, Larbex, Budfor, Edoflo, Actavis, Novolizer, Clickhaler.
Fludrocortison acetaat	Florinef, Panotile.
Hydrocortison	Apotex.

Hydrocortison acetaat	Bacicoline-B, Buccalsone, Calmurid HC, Otosporin, Proctosedyl, Solu-Cortef, Terra-Cortril, Daktacort.
Hydrocortison-17-butyraat	Locoid.
Methylprednisolon	Depo-Medrol, Solu-Medrol.
Prednisolon	Prednisolon Minims.
Prednisolon natrium	Di-adreson-F, Pred forte, Ultracortenol.
Prednison	Lodotra.
Tixocortol pivalaat	Pivalone.

Het betekent niet dat u voor alle corticosteroïden allergisch bent. U kunt wel corticosteroïden uit de andere groepen krijgen. In elke groep zitten corticosteroïden van verschillende sterktes.

<b>Groep 2</b>	<b>Voorbeelden</b>
Flunisolide	Syntaris
Triamcinolon acetonide	Kenakort-A, Mycolog, Trianal, Nasacort

<b>Groep 3</b>	<b>Voorbeelden</b>
Beclomethason dipropionaat	Aerobec, Beconase, Qvar
Betamethason	Betnesol, Celestone
Betamethason-17-valeraat	Betnelan, Celestoderm
Betamethason dipropionaat	Diprosalic, Diprosone, Diprolene, Dovobet
Clobetasol propionaat	Dermovate, Butavate
Clobetasol butyraat	Emovate
Desoximethason	Ibaril, Topicorte
Dexamethason	Decadron, Dexa-Pos, Dexagenta-Pos, Dexamytrex, Maxitrol, Oradexon, Sofradex, Tobradex
Diflucortolon valeraat	Nerisona

Flumethason pivalaat	Locacorten, Locacorten-Vioform, Locarten-Vioform, Locasalen
Fluticason furoaat	Avamys
Fluticason propionaat	Cutivate, Flixovate, Flixotide, Flixonase, Seretide
Momethason furoaat	Elocon, Nasonex

Voor de corticosteroiden **betamethason dipropionaat**, **betamethason-17-valeraat**, **desoximetason**, **fluticason propionaat** en **mometason furoaat** (corticosteroiden uit groep 3) zijn weinig allergieën bekend. Ze kunnen meestal veilig gebruikt worden.

## Waar komt het in voor?

Corticosteroiden worden vooral voorgeschreven bij de behandeling van huid- en slijmvliesaandoeningen, maar kunnen ook worden toegediend als tabletten, capsules of injecties, afhankelijk van de aandoening. Deze stof kan zijn toegevoegd aan medicinale

- Inhalers/ aerosols (bijvoorbeeld bij astma).
- Klysma's voor het darmslijmvlies.
- Neussprays.
- Oogdruppels.
- Oordruppels.
- Zalven, crèmes, lotions.
- Zetpillen.

Tixocortol pivalaat wordt vaak gebruikt bij aandoeningen van de luchtwegen zoals astma en COPD. Ook vermindert Tixocortol pivalaat de klachten van chronische darmziekten zoals de ziekte van Crohn.

# Andere benamingen

Vermijd producten met een van de volgende namen in de ingrediëntenlijst:

- Tixocortol 21-pivalate.
- Tixocortol pivalate.
- 1beta,17-Dihydroxy-21-mercaptopregn-4-ene-3,20-dione 21-pivalate.
- EINECS 259-706-4.
- JO 1016.
- Pivalone.
- Pregn-4-ene-3,20-dione, 21-((2,2-dimethyl-1-oxopropyl)thio)-11,17-dihydroxy-, (11beta)-.
- S-(11beta,17-Dihydroxypregn-4-ene-3,20-dione) 21-(thiopivalate).

# Kruisreacties

Uw lichaam kan een andere stof aanzien voor Tixocortol pivalaat . Dan reageert uw lichaam alsof u met Tixocortol pivalaat in aanraking komt. Dit noemen we een kruisreactie. Dit kan gebeuren bij de stoffen:

- Amcinonide.
- Cloprednol.
- Desonide.
- Fludrocortisone acetate.
- Fluocinolone acetonide.
- Fluocinonide.
- Flurandrenolide.
- Halcinonide.
- Hydrocortisone probutate.
- Hydrocortisone buteprate).
- Hydrocortisone valerate.

- Micronized fluocinonide.
- Prednicarbate.
- Prednisolone acetate.

## Tot slot

Als u na het lezen van de folder nog vragen heeft dan kunt u bellen met de polikliniek Dermatologie, tel. (078) 654 12 36. Dit kan van maandag t/m vrijdag tussen 08.00-12.00 uur en tussen 13.00-16.30 uur.

Geef hier uw mening over deze folder: [www.asz.nl/foldertest](http://www.asz.nl/foldertest)



Albert Schweitzer ziekenhuis  
september 2024  
pavo 1945