

Budesonide

Corticosteroiden groep 1

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

**albert
schweitzer**

Wat zijn corticosteroiden?

Corticosteroiden zijn medicijnen die zijn afgeleid van bijnierschors hormonen. Corticosteroiden onderdrukken allerlei ontstekingsreacties in het lichaam, waaronder ook eczeem. Corticosteroiden worden onderverdeeld in 3 groepen.

U bent hier allergisch voor: wat nu?

De dermatoloog heeft aangetoond dat u allergisch bent voor Budesonide, een corticosteroïde uit groep 1. Dit betekent dat u allergisch bent voor één of meer corticosteroiden uit groep 1. Wanneer u allergisch bent voor één van de medicijnen uit deze groep, kan het zijn dat u ook allergisch bent voor de andere medicijnen uit dezelfde groep. Wanneer u hiermee in aanraking komt, kan dat eczeem veroorzaken of verergeren. De dermatoloog kan niet voorspellen of u inderdaad voor alle medicijnen uit dezelfde groep allergisch bent. Het is dus belangrijk dat u probeert om contact met corticosteroiden uit groep 1 zoveel mogelijk te vermijden.

Groep 1	Voorbeelden
Budesonide	Budenofalk, Cortiment, Entocort, Pulmicort, Rhinocort, Symbicort, Assieme, Ribuspir, Sinestic, Larbex, Budfor, Edoflo, Actavis, Novolizer, Clickhaler.
Fludrocortison acetaat	Florinef, Panotile.
Hydrocortison	Apotex.
Hydrocortison acetaat	Bacicoline-B, Buccalsone, Calmurid HC, Otosporin, Proctosedyl, Solu-Cortef, Terra-Cortril, Daktacort.
Hydrocortison-17-butyraat	Locoid.
Methylprednisolon	Depo-Medrol, Solu-Medrol.
Prednisolon	Prednisolon Minims.

Prednisolon natrium	Di-adreson-F, Pred forte, Ultracortenol.
Prednison	Lodotra.
Tixocortol pivalaat	Pivalone.

Het betekent niet dat u voor alle corticosteroïden allergisch bent. U kunt wel corticosteroïden uit de andere groepen krijgen. In elke groep zitten corticosteroïden van verschillende sterktes.

Groep 2	Voorbeelden
Flunisolide	Syntaris
Triamcinolon acetonide	Kenakort-A, Mycolog, Trianal, Nasacort

Groep 3	Voorbeelden
Beclomethason dipropionaat	Aerobec, Beconase, Qvar
Betamethason	Betnesol, Celestone
Betamethason-17-valeraat	Betnelan, Celestoderm
Betamethason dipropionaat	Diprosalic, Diprosone, Diprolene, Dovobet
Clobetasol propionaat	Dermovate, Butavate
Clobetasol butyraat	Emovate
Desoximethason	Ibaril, Topicorte
Dexamethason	Decadron, Dexa-Pos, Dexagenta-Pos, Dexamytrex, Maxitrol, Oradexon, Sofradex, Tobradex
Diflucortolon valeraat	Nerisona
Flumethason pivalaat	Locacorten, Locacorten-Vioform, Locarten-Vioform, Locasalen
Fluticason furoaat	Avamys
Fluticason propionaat	Cutivate, Flixovate, Flixotide, Flixonase, Seretide
Momethason furoaat	Elocon, Nasonex

Voor de corticosteroïden **betamethason dipropionaat**, **betamethason-17-valeraat**, **desoximetason**, **fluticason propionaat** en **mometason furoaat** (corticosteroïden uit groep 3) zijn weinig allergieën bekend. Ze kunnen meestal veilig gebruikt worden.

Waar komt het in voor?

Corticosteroïden worden vooral voorgeschreven bij de behandeling van huid- en slijmvliesaanandoeningen, maar kunnen ook worden toegediend als tabletten, capsules of injecties, afhankelijk van de aanandoening. Deze stof kan zijn toegevoegd aan medicinale

- Inhalers/ aerosols (bijvoorbeeld bij astma).
- Klysma's voor het darmslijmvlies.
- Neussprays.
- Oogdruppels.
- Oordruppels.
- Zalven, crèmes, lotions.
- Zetpillen.

Budesonide wordt vaak gebruikt bij aanandoeningen van de luchtwegen zoals astma en COPD. Ook vermindert Budesonide klachten van chronische darmziekten zoals de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa.

Andere benamingen

Vermijd producten met een van de volgende namen in de ingrediëntenlijst:

- Budesonide.
- CCRIS 5230.
- EINECS 257-139-7.
- S 1320.
- (11-beta,16-alpha)-16,17-(Butylidenebis(oxy))-11,21-dihydroxypregna1,4-diene-3,20-dione.

- (RS)-11beta,16alpha,17,21-Tetrahydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione cyclic 16,17-acetal with butyraldehyde.
- 16-alpha,17-alpha-Butylidenedioxy-11-beta,21-dihydroxy-1,4-pregnadiene-3,20-dione.
- Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 16,17-(butylidenebis(oxy))-11,21-dihydroxy-, (11-beta,16-alpha)-.
- Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 16,17-butylidenebis(oxy)- 11,21-dihydroxy-, (11beta,16alpha(R))-.
- 16alpha,17-((S)- Butylidenebis(oxy))-11beta,21-dihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione.

Tot slot

Als u na het lezen van de folder nog vragen heeft dan kunt u bellen met de polikliniek Dermatologie, tel. (078) 654 12 36. Dit kan van maandag t/m vrijdag tussen 08.00-12.00 uur en tussen 13.00-16.30 uur.

Geef hier uw mening over deze folder: www.asz.nl/foldertest

Albert Schweitzer ziekenhuis
september 2024
pavo 1936